Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Notice sur le LUZULA FORSTERI, *espèce nouvelle pour la flore de Belgique*, par Armand Thielens.

Il y a quelques mois, je signalais, dans un travail inséré dans les Bulletins de notre Société, la découverte dans le bois d'Angre de plusieurs plantes nouvelles pour notre flore, parmi lesquelles je citerai *Carex depauperata* Good.

Ces découvertes avaient été faites par mon excellent ami et confrère, M. A. Lelièvre, de Valenciennes.

Le bois d'Angre et ses environs, qui forment l'extrême limite de notre pays du côté de la France, ne sont pour ainsi dire pas connus de nos compatriotes et cependant ils renferment une foule d'espèces intéressantes. En effet, M. Lelièvre vient d'y découvrir tout récemment encore une nouvelle plante pour notre flore, plante qui fait l'objet de cette courte notice.

Puissent les trouvailles de M. Lelièvre engager nos amateurs et surtout ceux du Hainaut à visiter souvent Angre et les environs immédiats de la frontière. En faisant ainsi, ils auront l'honneur des découvertes que viennent faire sur le territoire belge nos confrères de l'étranger.

Luzula Forsteri DC., *Syn. fl. Gall.*, 150 et *Ic. rar. Gall.*, I, t. 2. — Rchb., *Ic.*, IX, t. 382, f. 850. — Kirschl., *Cat*, (1827) et *Prodr.*, 177. — Desv., *Journ. bot.*, I, 141. — Duby, *Bot. Gall.*, 478. — Lois., *Fl.*, *Gall.*, I, p. 262. — Bill., *Exsicc.*, n° 84. — Hagenb., *Bas.*, I, 334. — Schultz, *Pal.*, 482, et *Exsicc.*, 736.
Juncus nemorosus Lmk., *Dict.*, 3. p. 272 (excl. syn.).

Description. — Souche cespiteuse. Tiges simples, assez grêles, faibles, dressées, hautes de 2-4 décimètres. Feuilles atteignant à peine la moitié de la tige, planes, bordées de longs poils et d'un beau pâle vert; les radicales

très-nombreuses, linéaires, poilues, atténuées à leur base, étalées-dressées; les caulinaires plus petites, engaînantes à leur base. Fleurs d'un jaune brunâtre. Graines ovoïdes, munies au sommet d'un appendice droit. Corymbe lâche, à rameaux inégaux, rameux et souvent multiflores, allongés, filiformes, dressés même après l'anthèse. Divisions périgonales lancéolées, longuement mucronées, brunes et luisantes sur le dos, blanches-scarieuses sur les bords. Capsule verte, ovoïde-trigone, aiguë, mucronée, un peu moins longue que le périgone.

Cette espèce habite les bois et fleurit en mai et juin. Lejeune (in *Fl. Spa*, p. 304) signale cette espèce entre Andrimont et Dison (Liége). Dans la *Revue*, p. 72, il dit que cette plante doit être rayée de la Flore, ayant pris pour elle une variété insignifiante de *Luzula pilosa* Willd.

Elle fut découverte, le 10 mai dernier, dans le bois d'Angre par MM. Boutmann et Lelièvre, botanistes français.

—

Liste des plantes rares ou peu communes qui croissent aux environs de Thielt-Notre-Dame (Brabant), par Armand Thielens.

La commune de Thielt-Notre-Dame est située au nord-est de Louvain. J'ai parcouru presque tout le Brabant, et nulle part je n'ai rencontré une flore aussi riche et aussi variée que celle de ce petit coin favorisé. J'ai dressé le catalogue des plantes que j'ai rencontrées dans cette intéressante localité; il comprend 446 espèces, mais je me bornerai ici à mentionner les plus rares.

Ranunculus hederaceus L. — Ruisseaux, lieux inondés, assez rare.
— *trichophyllos* Chaix. — Fossés, mares, très-rare.
Gypsophila muralis L. — Champs frais, très-rare.
Stellaria graminea L. — Bois, haies, rare.
Cerastium aquaticum L. — Bords des eaux, assez rare.
Radiola linoides Gmel. — Champs humides, assez rare.